

SPEKTRAMOX® DOSERING FÖR BARN

Observera att de uträknade doserna är ungefärliga baserade på dos för högsta vikten i intervallet, med avrundning uppåt till närmaste halv- eller hel ml. För exakt dos rekommenderas manuell beräkning.

Barnets vikt	Oral suspension 50 mg/ml + 13 mg/ml			Oral suspension 80 mg/ml + 12 mg/ml		
	Dosering vid 20mg/5mg/kg/dag	Dosering vid 40mg/10mg/kg/dag	Dosering vid 60 mg/15mg/kg/dag	Dosering vid 25mg/3,6mg/kg/dag	Dosering vid 45mg/6,4mg/kg/dag	Dosering vid 70mg/10mg/kg/dag
	<i>Ej testat vid styrka > 40 mg/10 mg/kg/dag till barn yngre än 2 år.</i>			<i>Ej < 2 mån ålder. Ej testat vid styrka > 45 mg/6,4 mg/kg/dag till barn yngre än 2 år.</i>		
≥6 - < 7 kg	1,0 ml x 3	2,0 ml x 3	2,5 ml x 3	1,0 ml x 2	2,0 ml x 2	3,0 ml x 2
≥7 - < 8 kg	1,0 ml x 3	2,0 ml x 3	3,0 ml x 3	1,5 ml x 2	2,0 ml x 2	3,0 ml x 2
≥8 - < 9 kg	1,5 ml x 3	2,5 ml x 3	4,0 ml x 3	1,5 ml x 2	3,0 ml x 2	4,0 ml x 2
≥9 - < 10 kg	1,5 ml x 3	3,0 ml x 3	4,0 ml x 3	2,0 ml x 2	3,0 ml x 2	4,5 ml x 2
≥10 - < 12 kg	2,0 ml x 3	3,5 ml x 3	5,0 ml x 3	2,0 ml x 2	3,5 ml x 2	5,5 ml x 2
≥12 - < 14 kg	2,0 ml x 3	4,0 ml x 3	6,0 ml x 3	2,5 ml x 2	4,0 ml x 2	6,5 ml x 2
≥14 - < 16 kg	2,5 ml x 3	4,5 ml x 3	6,5 ml x 3	2,5 ml x 2	4,5 ml x 2	7,0 ml x 2
≥16 - < 18 kg	2,5 ml x 3	5,0 ml x 3	7,5 ml x 3	3,0 ml x 2	5,0 ml x 2	8,0 ml x 2
≥18 - < 20 kg	3,0 ml x 3	5,5 ml x 3	8,0 ml x 3	3,5 ml x 2	6,0 ml x 2	9,0 ml x 2
≥20 - < 25 kg	3,5 ml x 3	7,0 ml x 3	10,0 ml x 3	4,0 ml x 2	7,0 ml x 2	11,0 ml x 2
≥25 - < 30 kg	4,0 ml x 3	8,0 ml x 3	12,0 ml x 3	5,0 ml x 2	8,5 ml x 2	13,5 ml x 2
≥30 - < 40 kg	5,5 ml x 3	11,0 ml x 3 eller 500/125 mg 1 tabl x 3	16,0 ml x 3	6,5 ml x 2 eller 500/125 mg 1 tabl x 2	11,5 ml x 2 eller 875/125 mg 1 tabl x 2	17,5 ml x 2
>40 kg	500/125 mg 1 tabl x 3	500 mg/125 mg 1 tabl x 3	500 mg/125 mg 1 tabl x 3	875/125 mg 1 tabl x 2-3*	875/125 mg 1 tabl x 2-3*	875/125 mg 1 tabl x 2-3*

* Högre dos (1 tabl x 3) är särskilt för infektioner som t.ex. otitis media, sinuit, nedre luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner.

Beräkna manuellt: Barnets vikt x dygnsdosen (mg/kg kroppsvikt) / vald styrka (50 mg/ml eller 80 mg/ml). Dela sedan med antalet dostillfällen under ett dygn så får du antal ml som ska ges varje gång. Räkneexempel: Barnet väger 8 kg och 60 mg/kg/dygn är avsedd dosering (tex otit, sinuit, pneumoni). Då ger det 8 kg x 60 mg/kg /styrkan 50 mg/ml = 9,6 ml per dygn. Eftersom denna styrka doseras 3 ggr per dag ger det 3,2 ml vid varje dostillfälle.

Spektramox® (amoxicillin/klavulansyra) ATC-kod: J01CR02, Rx, filmdragerad tablett 250 mg/125 mg (EF), 500 mg/125 mg, 875/125 mg (EF); pulver till oral suspension 50 mg/ml + 13 mg/ml (F), 80 mg/ml + 12 mg/ml (F). **Indikation:** Akut bakteriell sinuit (adekvat diagnostiserad), Akut otitis media, Akuta exacerbationer av kronisk bronkit (adekvat diagnostiserad), Samhällsförvärd pneumoni, cystit, pyelonefrit, Hud- och mjukdelsinfektioner, (särskilt cellulit, djurbett, allvarlig dental abscess med spridande cellulit), skelett- och ledinfektioner, (särskilt osteomyelit). **Dosering:** www.fass.se **Förpackningar och priser:** www.fass.se. Produktresumén granskad senast 2018-10-18. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.